



G1 P1 L1 28 años

Implantes hace 10 años.

De copa AA a B.

Incisión en parte inferior de la areola.

Lactancia exclusiva por 6 meses y continua a los 9 meses con alimentación complementaria.

El primer mes y medio presentó infección de candida en los conductos lactíferos del seno derecho.

Usó el extractor en el seno derecho mientras duró el proceso de dolor, tratamiento y recuperación.

Lactaba solo del seno izquierdo.

La bebé prefirió seguir mamando solo del izquierdo y la mamá continuó extrayendo del derecho hasta los 5 1/2 meses.

Ese pecho regresó a su tamaño pre-embarazo y la areola se ha mantenido oscura mientras que la del izquierdo se ha aclarado.

El seno izquierdo se mantiene grande.

A los 7 meses empezó a extraerse nuevamente del seno derecho 1 vez al día.



G2 P2 L2 29 años

bebé 1: Lactancia mixta.

bebé 2: solo fórmula en las noches de los 2 días en la clínica.

Esta foto es después de haberse ordeñado.



G1 P1 L1 22 años
bebé 2 1/2 meses, lactancia exclusiva.
No ha presentado problemas.





G2 P2 L2 27 años

bebé 1: 2 años 5 meses, lactancia mixta 3 1/2 meses.

Suspendió por mastitis en seno derecho

bebé 2: 8 meses, lactancia exclusiva y continua con
alimentación complementaria con otros alimentos. Nota más
leche en seno izquierdo.



G1 P1 L1 35 años